[Click Here](#)

Para que serve o legalon

Legalon com posologia, indicações, efeitos colaterais, interações e outras informações. Todas as informações contidas na bula de Legalon têm a intenção de informar e educar, não pretendendo, de forma alguma, substituir as orientações de um profissional médico ou servir como recomendação para qualquer tipo de tratamento. Decisões relacionadas a tratamento de pacientes com Legalon devem ser tomadas por profissionais autorizados, considerando as características de cada paciente.Todas as bulas constantes em nosso portal são meramente informativas. Em caso de dúvidas quanto ao conteúdo de algum medicamento, procure orientação de seu médico ou farmacêutico.A 4ª edição não vende nenhum tipo de medicamento.LaboratórioNycomedApresentação de LegalonDrágea 70 mg, Embalagens com 45 unidades. Uso oral. Cápsula 140 mg, Embalagens com 30 unidades. Uso oral. Suspensão: Frascos com 120 ml. Uso oral. USO ADULTOComposição Cada drágea contém: Extrato seco de Carduus marianus*..... 86,5 a 93,3 mg * (equivalente a 70 mg de silimarina) Excipientes q.s.p..... 1 drágea Excipientes: dióxido de silício, amido de milho, povidona, estearato de magnésio, lactose, sacarose, corante amarelo crepúsculo, dióxido de titânio e goma arábica. OBS: cada drágea contém 0,11 g de açúcar na forma de sacarose. Cada cápsula contém: Extrato seco de Carduus marianus* 173,0 a 186,7 mg *(equivalente a 140 mg de silimarina) Excipiente q.s.p..... 1 cápsula Excipientes: ácido cítrico, sorbitol, ácido ascorbico, benzoato de sódio, celulose microcristalina, carboximetilcelulose, sorbato de potássio, silicato de alumínio e magnésio e água purificada. Extrato seco de Carduus marianus*.....61,8 a 66,7 mg *(equivalente a 50 mg de silimarina) Veículo q.s.p..... 5 ml Excipientes: ácido cítrico, sorbitol, ácido ascorbico, benzoato de sódio, celulose microcristalina, carboximetilcelulose, sorbato de potássio, silicato de alumínio e magnésio e água purificada. Cada 5 ml da suspensão contém 50 mg de silimarina, calculados como silibinaína.Nomenclatura botânica e parte utilizada da planta Carduus marianus L. (Compositae), fruto. Legalon - Indicações- NO tratamento dos distúrbios digestivos que ocorrem nas hepatopatias. Contra-indicações de LegalonHipersensibilidade aos componentes da planta.AvertênciasA administração do preparado não exige precauções especiais. Estudos de fertilidade em animais realizados com Legalon não indicaram efeitos prejudiciais relativos à reprodução, desenvolvimento feto/embrão, parto e pós-parto. Não há experimentos disponíveis com Legalon em humanos durante a gravidez e lactação. Portanto, Legalon® somente deve ser utilizado nesses casos sob orientação médica.Atenção diabéticos: Legalon® Drágeas contém açúcar. Legalon® Cápsulas contém o corante amarelo de tartrazina que pode causar reações de natureza alérgica entre as quais asma brônquica, especialmente em pessoas alérgicas ao ácido acetilsalicílico. Interações medicamentosas de LegalonAté o momento não foram relatados casos de interação medicamentosa com o uso do produto.Reações adversas / Efeitos colaterais de LegalonForam relatados raros casos de gastralgias e episódios diarreicos. Excepcionalmente, podem ocorrer reações alérgicas cutâneas. Legalon - PosologiaConforme a gravidade dos sintomas recomenda-se: Legalon® 70 (Drágeas): O tratamento deve ser iniciado com 2 drágeas, 3 vezes ao dia. Para a dose de manutenção deve ser administrada 1 drágea, 3 vezes ao dia.Legalon® 140 (Cápsulas): A menos que haja outra orientação, o tratamento deve ser iniciado com 1 cápsula, 3 vezes ao dia. Para a dose de manutenção: 1 cápsula, 2 vezes ao dia.Legalon® Suspensão AGITE ANTES DE USAR: Adolescentes: 7,5 ml (1 1/2 colher das de chá), 3 vezes ao dia.Adultos: 10 ml (2 colheres das de chá), 3 vezes ao dia. Nos casos mais graves, e a critério médico, estas doses podem ser aumentadas.SuperdosagemNa eventualidade da ingestão acidental de doses muito acima das preconizadas, recomenda-se adotar as medidas habituais de controle das funções vitais. Não foram relatados, até o momento, sintomas relacionados à superdose. Na eventualidade da ingestão acidental de doses muito acima das preconizadas, procure imediatamente assistência médica. Não tome nenhuma medida sem antes consultar um médico. Informe ao médico o medicamento que utilizou a dose (quantidade) e os sintomas presentes.Características farmacológicasA silimarina, componente ativo do Legalon®, age como estabilizador das membranas dos hepatócitos, resguardando sua integridade e, assim, a função fisiológica do fígado; protege, experimentalmente, a célula hepática da influência nociva das substâncias tóxicas endógenas e/ou exógenas. Desta maneira, Legalon® atua de forma benéfica no tratamento das doenças hepáticas crônicas inflamatórias, cirrose hepática e lesões hepatotóxicas, promovendo rápida melhora dos sintomas clínicos, como febre, astenia, anorexia, distúrbios digestivos, sensação de peso epigástrico, etc. Em pacientes com síndrome silimbiótica, a administração de Legalon® promove a regeneração do parênquima hepático, aparentemente aumentando a síntese de RNA no fígado.Propriedades farmacodinâmicasA eficácia antitóxica da silimarina foi demonstrada em vários modelos de danos no fígado, por exemplo, com o veneno da Amanita phalloides, faloidina e amanitina, com lantânídeos, tetracloreto de carbono, galactosamina, tioacetamina e vírus hepatotóxico FV3. Os efeitos terapêuticos da silimarina são atribuídos aos vários mecanismos de ação: Devido ao poder de remover radicais, a silimarina possui atividade antioxidante. O processo fisiopatológico de peroxidação lipídica, que é o responsável pela destruição de membranas celulares, é interrompido ou prevenido. Além disso, em células do fígado, que já apresentam danos, a silimarina estimula a síntese proteica e normaliza o metabolismo fosfolipídico. O resultado final é que a membrana celular é estabilizada reduzindo e prevenindo a liberação de enzimas presentes no citoplasma da célula hepática (por ex. transaminases). A silimarina restringe a entrada de certas substâncias hepatotóxicas na célula (veneno do cogumelo Amanita phalloides). A elevação da síntese proteica pela silimarina é devido à estimulação da RNA polimerase I, uma enzima localizada no núcleo. Isso acarreta em um aumento na formação de RNA ribossômico com aumento de síntese de proteínas estruturais e funcionais (enzimas). O resultado é um aumento na capacidade reparadora e regenerativa do fígado.Propriedades farmacocinéticas O principal constituinte da silimarina é a silibinaína. Investigações clínicas mostram que depois de absorvida no trato digestivo, esta é excretada principalmente na bile (> 80% da quantidade absorvida). Como metabólitos, glicuronídeos e sulfatos foram encontradas nabile. Acredita-se que a silibinaína é reabsorvida após ser desconjugada e então, penetra na circulação entero-hepática, como demonstrado em experimentos animais. Como se espera que a eliminação ocorra na bile glicuronídeos e sulfatos. Acredita-se que a silimarina seja reabsorvida após ser desconjugada e que então penetre na circulação entero-hepática, como se demonstrou em experimentos animais. Como se espera que a eliminação seja predominantemente biliar (sítio de ação: fígado) os níveis sanguíneos são baixos e a eliminação é rápida. Resultados de segurança em ensaios clínicos em humanos são os mesmos após doses repetidas de 140 mg. Estes resultados mostram que a silibinaína não se acumula no organismo. Após administração repetida de silimarina em doses de 140 mg três vezes ao dia, a eliminação biliar alcança o estado de equilíbrio.Dados de segurança pré-clínicaA silimarina é caracterizada por sua excepcional baixa toxicidade, podendo, portanto ser seguramente administrada em doses terapêuticas por longos períodos.Toxicidade aguda Administrada oralmente a ratos e camundongos, a silimarina demonstrou ser praticamente atóxica, e a DL50 pode ser estabelecida como > 2000 mg/kg.Toxicidade crônica Em ensaios a longo prazo de até 12 meses, ratos e cachorros receberam silimarina oralmente em doses máximas de 2500 ou 1200 mg/kg respectivamente. Não foi demonstrada nenhuma evidência de efeitos tóxicos, nem nos resultados laboratoriais, nem em achados de autópsia.Toxicidade na reprodução Estudos de fertilidade em ratos e coelhos, em conjunto com estudos de toxicidade pré-natal, perinatal e pós-natal não revelaram nenhum efeito adverso em nenhum dos estágios de reprodução (dose máxima testada: 2500 mg/kg). Em particular, a silimarina não demonstrou nenhuma evidência de potencial teratogênico. Mutagenicidade Investigações in vitro e in vivo com a silimarina apresentaram resultados negativos.CarcinogenicidadeAinda não foram realizados estudos apropriados in vivo em roedores. Legalon é um hepatoprotetor indicado para o tratamento dos distúrbios digestivos que ocorrem nas doenças do fígado e das lesões tóxicas do fígado, e como tratamento de suporte na doença inflamatória crônica do fígado e na cirrose hepática. Quais os efeitos da silimarina? Existem alguns efeitos colaterais causados no início do tratamento com a silimarina, seja na forma de suplemento ou ainda do chá feito a partir da planta. além da diarreia, ela também pode causar excesso de flatulência (gases), inchaço na barriga, irritação no estômago e náuseas. Onde encontrar o medicamento Legalon? Legalon 90mg com 30 drágeas | Droga Raia. Legalon é um fitoterápico, ou seja, um medicamento à base de plantas medicinais. O seu componente ativo é a silimarina (Silybum marianum (L.) Gaertn), que real contém uma substância das membranas celulares do fígado (hepatócitos). Assim, o remédio é classificado como um hepatoprotetor. A indicação de Legalon é para o tratamento dos distúrbios digestivos que aparecem na doença do fígado e de lesões tóxicas do fígado. Além disso, usa-se Legalon como tratamento de suporte para a doença inflamatória crônica do fígado e a cirrose hepática.A bula do medicamento descreve que,
experimentalmente, o fitoterápico protege a célula hepática contra efeitos danosos de substâncias tóxicas externas ou internas. Espera-se que a partir de quatro semanas de tratamento, o remédio promova uma melhora gradual e progressiva de sintomas relacionados à hepatite, cirrose hepática ou lesões tóxicas do fígado, como distúrbios digestivos, desconforto abdominal, fraqueza, falta de apetite e enjoo.É importante citar ainda que a bula de Legalon alerta que o medicamento não substitui a necessidade de evitar as causas de problemas no fígado, como a ingestão de álcool e outras substâncias.O componente ativo de Legalon é a silimarinaO Legalon pode causar efeitos colaterais, no entanto, as reações adversas do fitoterápico são raras ou muito raras, conforme mostrado a seguir:Hipersensibilidade (alergia)Erupção cutânea (brotejas)Dispnéia (dificuldade de respirar).Em outras palavras, não é tudo mundo que vai ter uma reação ao usar Legalon e as chances de que surja algum efeito colateral são baixas. Entretanto, caso tenha algum problema durante o tratamento, informe o seu médico, especialmente se houver algum sintoma grave.Embora seja um medicamento fitoterápico, Legalon tem algumas contra-indicações. Por exemplo, o remédio não deve ser usado por pessoas que tenham alergia a um ou mais componentes da sua fórmula.Além disso, como não há dados suficientes sobre o uso em crianças, recomenda-se que menores de 12 anos não utilizem o medicamento. A bula ainda ressalta que as mulheres grávidas ou que amamentam não devem usar o medicamento, exceto se houver orientação médica.Assim, a mulher que utiliza o fitoterápico deve informar ao seu médico caso fique grávida ao longo do tratamento. Ao mesmo tempo, caso ocorra icterícia (coloração amarela da pele e do branco dos olhos), a bula também recomenda que o paciente procure imediatamente a ajuda de um médico.Há uma recomendação na bula do remédio para 3 cápsulas ao dia para auxiliar no tratamento de problemas do fígado e complementar o tratamento médico convencional. Vei outras formas de usar o cartão mariano. Se deseja o acompanhamento, avaliação e um tratamento mais completo de problema no fígado, marque uma consulta com um gastroenterologista na região mais próxima. Como tomar A silimarina deve ser tomada por via oral, nos horários estabelecidos pelo médico. Na forma de cápsulas e comprimidos, a silimarina deve ser tomada com um copo de água. Já o xarope, deve ser tomado usando o copo dosador fornecido na embalagem. A posologia da silimarina para adultos varia de acordo com sua apresentação que inclui: 1. Silimarina cápsulas duras As cápsulas duras contém 200 mg ou 300 mg de silimarina (Forfig) sendo que as doses recomendadas para adultos são: Cápsulas duras de 200 mg (Forfig): a dose inicial recomendada é de 1 cápsula dura de 200 mg, 3 vezes por dia. A dose de manutenção recomendada é de 1 cápsula dura de 200 mg, 2 vezes por dia; Cápsulas duras de 300 mg (Forfig): a dose inicial recomendada é de 1 cápsula dura de 300 mg, 2 vezes por dia. A dose de manutenção é de 1 cápsula dura de 300 mg, 1 vez por dia. As cápsulas duras devem ser engolidas inteiras, sem partir ou mastigar e o tempo de tratamento deve ser orientado pelo médico. 2. Silimarina cápsulas moles As cápsulas moles ou gelatinosas contêm 100 mg, 180 mg ou 200 mg de silimarina, encontrada com os nomes comerciais Steaton e Legalon. As doses recomendadas para adultos são: Cápsulas moles de 100 mg (Steaton): a dose inicial recomendada é de 2 cápsulas mole de 100 mg, 3 vezes por dia, que deve ser reduzida pelo médico para 1 cápsula de 200 mg, 3 vezes por dia, após 4 a 8 semanas de tratamento; Cápsulas moles de 200 mg (Steaton): a dose inicial recomendada é de 1 cápsula mole de 200 mg, 3 vezes por dia. Essa dose deve ser reduzida pelo médico após 4 a 8 semanas de tratamento para 1 cápsula mole de 200 mg, 2 vezes por dia; Cápsulas gelatinosas de 180 mg (Legalon): a dose inicial recomendada é de 1 cápsula gelatinosa (L) Gaertn, 3 vezes por dia, após 4 a 8 semanas de tratamento para 1 cápsula gelatinosa de 180 mg, 2 vezes por dia. A dose de manutenção recomendada é de 1 cápsula gelatinosa de 180 mg, 2 vezes por dia. As cápsulas moles e comprimidos de Legalon são comprimidos de 200 mg (Lison): a dose inicial recomendada é de 2 comprimidos de 120 mg, 2 vezes por dia. A dose de manutenção é de 1 comprimido de 200 mg, 3 vezes por dia; Drágea 90 mg (Legalon): a dose inicial recomendada é de 2 drágeas de 90 mg, 3 vezes por dia. A dose de manutenção é de 1 drágea de 90 mg, 3 vezes por dia. Essas doses podem ser aumentadas pelo médico, de acordo com a condição e ser tratada e gravidade dos sintomas. 4. Silimarina xarope O xarope ou suspensão oral contém 17,138 mg/mL ou 64 mg/5ml, de silimarina, encontrada com os nomes comerciais Legalon ou Lison. As doses normalmente recomendadas da suspensão oral são: Adolescentes (xarope de 64 mg/mL - Legalon): 7,5 ml (1 ½ colher de chá), 3 vezes por dia; Adultos (xarope de 64 mg/mL - Legalon, ou xarope 17,138 mg/mL - Lison): 10 ml (2 colheres de chá), 3 vezes por dia. Estas doses devem ser sempre adequadas à gravidade dos sintomas e, por isso, devem ser sempre calculadas por um hepatologista antes de iniciar o uso do medicamento. É importante agitar bem o frasco do xarope antes de usar, para misturar os ingredientes da fórmula e garantir a dose correta. Possíveis efeitos colaterais Os efeitos colaterais mais comuns da silimarina são boca seca, náuseas, vômitos, diarreia, dor abdominal ou dor no estômago. Além disso, também podem surgir dor de cabeça, fraqueza, suor excessivo, urticária, coceira ou alergia na pele. A silimarina também pode causar reações alérgicas graves ou anafiláticas, devendo-se procurar o pronto socorro mais próximo caso surjam sintomas como dificuldade para respirar, inchaço no rosto, lábios, boca, língua ou garganta, ou mesmo. Saiba identificar todos os sintomas da anafilaxia. Quem não deve tomar A silimarina não deve ser usada por crianças ou por pessoas que tenham alergia a silimarina ou qualquer outro componente das fórmulas. Além disso, a silimarina não deve ser usada durante a gravidez e lactação. Não se deve tomar a silimarina durante a amamentação, pois há risco de transferência da silimarina para o leite materno. A silimarina também pode causar reações alérgicas graves ou anafiláticas, devendo-se procurar o pronto socorro mais próximo caso surjam sintomas como dificuldade para respirar, inchaço no rosto, lábios, boca, língua ou garganta, ou mesmo. Saiba identificar todos os sintomas da anafilaxia. Quem não deve tomar A silimarina não deve ser usada por crianças ou por pessoas que tenham alergia a silimarina ou qualquer outro componente das fórmulas. Além disso, a silimarina não deve ser usada durante a gravidez e lactação. Não se deve tomar a silimarina durante a amamentação, pois há risco de transferência da silimarina para o leite materno. A silimarina também pode causar reações alérgicas graves ou anafiláticas, devendo-se procurar o pronto socorro mais próximo caso surjam sintomas como dificuldade para respirar, inchaço no rosto, lábios, boca, língua ou garganta, ou mesmo. Saiba identificar todos os sintomas da anafilaxia. Quem não deve tomar A silimarina não deve ser usada por crianças ou por pessoas que tenham alergia a silimarina ou qualquer outro componente das fórmulas. Além disso, a silimarina não deve ser usada durante a gravidez e lactação. Não se deve tomar a silimarina durante a amamentação, pois há risco de transferência da silimarina para o leite materno. A silimarina também pode causar reações alérgicas graves ou anafiláticas, devendo-se procurar o pronto socorro mais próximo caso surjam sintomas como dificuldade para respirar, inchaço no rosto, lábios, boca, língua ou garganta, ou mesmo. Saiba identificar todos os sintomas da anafilaxia. Quem não deve tomar A silimarina não deve ser usada por crianças ou por pessoas que tenham alergia a silimarina ou qualquer outro componente das fórmulas. Além disso, a silimarina não deve ser usada durante a gravidez e lactação. Não se deve tomar a silimarina durante a amamentação, pois há risco de transferência da silimarina para o leite materno. A silimarina também pode causar reações alérgicas graves ou anafiláticas, devendo-se procurar o pronto socorro mais próximo caso surjam sintomas como dificuldade para respirar, inchaço no rosto, lábios, boca, língua ou garganta, ou mesmo. Saiba identificar todos os sintomas da anafilaxia. Quem não deve tomar A silimarina não deve ser usada por crianças ou por pessoas que tenham alergia a silimarina ou qualquer outro componente das fórmulas. Além disso, a silimarina não deve ser usada durante a gravidez e lactação. Não se deve tomar a silimarina durante a amamentação, pois há risco de transferência da silimarina para o leite materno. A silimarina também pode causar reações alérgicas graves ou anafiláticas, devendo-se procurar o pronto socorro mais próximo caso surjam sintomas como dificuldade para respirar, inchaço no rosto, lábios, boca, língua ou garganta, ou mesmo. Saiba identificar todos os sintomas da anafilaxia. Quem não deve tomar A silimarina não deve ser usada por crianças ou por pessoas que tenham alergia a silimarina ou qualquer outro componente das fórmulas. Além disso, a silimarina não deve ser usada durante a gravidez e lactação. Não se deve tomar a silimarina durante a amamentação, pois há risco de transferência da silimarina para o leite materno. A silimarina também pode causar reações alérgicas graves ou anafiláticas, devendo-se procurar o pronto socorro mais próximo caso surjam sintomas como dificuldade para respirar, inchaço no rosto, lábios, boca, língua ou garganta, ou mesmo. Saiba identificar todos os sintomas da anafilaxia. Quem não deve tomar A silimarina não deve ser usada por crianças ou por pessoas que tenham alergia a silimarina ou qualquer outro componente das fórmulas. Além disso, a silimarina não deve ser usada durante a gravidez e lactação.
Não se deve tomar a silimarina durante a amamentação, pois há risco de transferência da silimarina para o leite materno. A silimarina também pode causar reações alérgicas graves ou anafiláticas, devendo-se procurar o pronto socorro mais próximo caso surjam sintomas como dificuldade para respirar, inchaço no rosto, lábios, boca, língua ou garganta, ou mesmo. Saiba identificar todos os sintomas da anafilaxia. Quem não deve tomar A silimarina não deve ser usada por crianças ou por pessoas que tenham alergia a silimarina ou qualquer outro componente das fórmulas. Além disso, a silimarina não deve ser usada durante a gravidez e lactação. Não se deve tomar a silimarina durante a amamentação, pois há risco de transferência da silimarina para o leite materno. A silimarina também pode causar reações alérgicas graves ou anafiláticas, devendo-se procurar o pronto socorro mais próximo caso surjam sintomas como dificuldade para respirar, inchaço no rosto, lábios, boca, língua ou garganta, ou mesmo. Saiba identificar todos os sintomas da anafilaxia. Quem não deve tomar A silimarina não deve ser usada por crianças ou por pessoas que tenham alergia a silimarina ou qualquer outro componente das fórmulas. Além disso, a silimarina não deve ser usada durante a gravidez e lactação. Não se deve tomar a silimarina durante a amamentação, pois há risco de transferência da silimarina para o leite materno. A silimarina também pode causar reações alérgicas graves ou anafiláticas, devendo-se procurar o pronto socorro mais próximo caso surjam sintomas como dificuldade para respirar, inchaço no rosto, lábios, boca, língua ou garganta, ou mesmo. Saiba identificar todos os sintomas da anafilaxia. Quem não deve tomar A silimarina não deve ser usada por crianças ou por pessoas que tenham alergia a silimarina ou qualquer outro componente das fórmulas. Além disso, a silimarina não deve ser usada durante a gravidez e lactação. Não se deve tomar a silimarina durante a amamentação, pois há risco de transferência da silimarina para o leite materno. A silimarina também pode causar reações alérgicas graves ou anafiláticas, devendo-se procurar o pronto socorro mais próximo caso surjam sintomas como dificuldade para respirar, inchaço no rosto, lábios, boca, língua ou garganta, ou mesmo. Saiba identificar todos os sintomas da anafilaxia. Quem não deve tomar A silimarina não deve ser usada por crianças ou por pessoas que tenham alergia a silimarina ou qualquer outro componente das fórmulas. Além disso, a silimarina não deve ser usada durante a gravidez e lactação. Não se deve tomar a silimarina durante a amamentação, pois há risco de transferência da silimarina para o leite materno. A silimarina também pode causar reações alérgicas graves ou anafiláticas, devendo-se procurar o pronto socorro mais próximo caso surjam sintomas como dificuldade para respirar, inchaço no rosto, lábios, boca, língua ou garganta, ou mesmo. Saiba identificar todos os sintomas da anafilaxia. Quem não deve tomar A silimarina não deve ser usada por crianças ou por pessoas que tenham alergia a silimarina ou qualquer outro componente das fórmulas. Além disso, a silimarina não deve ser usada durante a gravidez e lactação. Não se deve tomar a silimarina durante a amamentação, pois há risco de transferência da silimarina para o leite materno. A silimarina também pode causar reações alérgicas graves ou anafiláticas, devendo-se procurar o pronto socorro mais próximo caso surjam sintomas como dificuldade para respirar, inchaço no rosto, lábios, boca, língua ou garganta, ou mesmo. Saiba identificar todos os sintomas da anafilaxia. Quem não deve tomar A silimarina não deve ser usada por crianças ou por pessoas que tenham alergia a silimarina ou qualquer outro componente das fórmulas. Além disso, a silimarina não deve ser usada durante a gravidez e lactação. Não se deve tomar a silimarina durante a amamentação, pois há risco de transferência da silimarina para o leite materno. A silimarina também pode causar reações alérgicas graves ou anafiláticas, devendo-se procurar o pronto socorro mais próximo caso surjam sintomas como dificuldade para respirar, inchaço no rosto, lábios, boca, língua ou garganta, ou mesmo. Saiba identificar todos os sintomas da anafilaxia. Quem não deve tomar A silimarina não deve ser usada por crianças ou por pessoas que tenham alergia a silimarina ou qualquer outro componente das fórmulas. Além disso, a silimarina não deve ser usada durante a gravidez e lactação. Não se deve tomar a silimarina durante a amamentação, pois há risco de transferência da silimarina para o leite materno. A silimarina também pode causar reações alérgicas graves ou anafiláticas, devendo-se procurar o pronto socorro mais próximo caso surjam sintomas como dificuldade para respirar, inchaço no rosto, lábios, boca, língua ou garganta, ou mesmo. Saiba identificar todos os sintomas da anafilaxia. Quem não deve tomar A silimarina não deve ser usada por crianças ou por pessoas que tenham alergia a silimarina ou qualquer outro componente das fórmulas. Além disso, a silimarina não deve ser usada durante a gravidez e lactação. Não se deve tomar a silimarina durante a amamentação, pois há risco de transferência da silimarina para o leite materno. A silimarina também pode causar reações alérgicas graves ou anafiláticas, devendo-se procurar o pronto socorro mais próximo caso surjam sintomas como dificuldade para respirar, inchaço no rosto, lábios, boca, língua ou garganta, ou mesmo. Saiba identificar todos os sintomas da anafilaxia. Quem não deve tomar A silimarina não deve ser usada por crianças ou por pessoas que tenham alergia a silimarina ou qualquer outro componente das fórmulas. Além disso, a silimarina não deve ser usada durante a gravidez e lactação. Não se deve tomar a silimarina durante a amamentação, pois há risco de transferência da silimarina para o leite materno. A silimarina também pode causar reações alérgicas graves ou anafiláticas, devendo-se procurar o pronto socorro mais próximo caso surjam sintomas como dificuldade para respirar, inchaço no rosto, lábios, boca, língua ou garganta, ou mesmo. Saiba identificar todos os sintomas da anafilaxia. Quem não deve tomar A silimarina não deve ser usada por crianças ou por pessoas que tenham alergia a silimarina ou qualquer outro componente das fórmulas. Além disso, a silimarina não deve ser usada durante a gravidez e lactação. Não se deve tomar a silimarina durante a amamentação, pois há risco de transferência da silimarina para o leite materno. A silimarina também pode causar reações alérgicas graves ou anafiláticas, devendo-se procurar o pronto socorro mais próximo caso surjam sintomas como dificuldade para respirar, inchaço no rosto, lábios, boca, língua ou garganta, ou mesmo. Saiba identificar todos os sintomas da anafilaxia. Quem não deve tomar A silimarina não deve ser usada por crianças ou por pessoas que tenham alergia a silimarina ou qualquer outro componente das fórmulas. Além disso, a silimarina não deve ser usada durante a gravidez e lactação. Não se deve tomar a silimarina durante a amamentação, pois há risco de transferência da silimarina para o leite materno. A silimarina também pode causar reações alérgicas graves ou anafiláticas, devendo-se procurar o pronto socorro mais próximo caso surjam sintomas como dificuldade para respirar, inchaço no rosto, lábios, boca, língua ou garganta, ou mesmo. Saiba identificar todos os sintomas da anafilaxia. Quem não deve tomar A silimarina não deve ser usada por crianças ou por pessoas que tenham alergia a silimarina ou qualquer outro componente das fórmulas. Além disso, a silimarina não deve ser usada durante a gravidez e lactação. Não se deve tomar a silimarina durante a amamentação, pois há risco de transferência da silimarina para o leite materno. A silimarina também pode causar reações alérgicas graves ou anafiláticas, devendo-se procurar o pronto socorro mais próximo caso surjam sintomas como dificuldade para respirar, inchaço no rosto, lábios, boca, língua ou garganta, ou mesmo. Saiba identificar todos os sintomas da anafilaxia. Quem não deve tomar A silimarina não deve ser usada por crianças ou por pessoas que tenham alergia a silimarina ou qualquer outro componente das fórmulas. Além disso, a silimarina não deve ser usada durante a gravidez e lactação. Não se deve tomar a silimarina durante a amamentação, pois há risco de transferência da silimarina para o leite materno. A silimarina também pode causar reações alérgicas graves ou anafiláticas, devendo-se procurar o pronto socorro mais próximo caso surjam sintomas como dificuldade para respirar, inchaço no rosto, lábios, boca, língua ou garganta, ou mesmo. Saiba identificar todos os sintomas da anafilaxia. Quem não deve tomar A silimarina não deve ser usada por crianças ou por pessoas que tenham alergia a silimarina ou qualquer outro componente das fórmulas. Além disso, a silimarina não deve ser usada durante a gravidez e lactação. Não se deve tomar a silimarina durante a amamentação, pois há risco de transferência da silimarina para o leite materno. A silimarina também pode causar reações alérgicas graves ou anafiláticas, devendo-se procurar o pronto socorro mais próximo caso surjam sintomas como dificuldade para respirar, inchaço no rosto, lábios, boca, língua ou garganta, ou mesmo. Saiba identificar todos os sintomas da anafilaxia. Quem não deve tomar A silimarina não deve ser usada por crianças ou por pessoas que tenham alergia a silimarina ou qualquer outro componente das fórmulas. Além disso, a silimarina não deve ser usada durante a gravidez e lactação. Não se deve tomar a silimarina durante a amamentação, pois há risco de transferência da silimarina para o leite materno. A silimarina também pode causar reações alérgicas graves ou anafiláticas, devendo-se procurar o pronto socorro mais próximo caso surjam sintomas como dificuldade para respirar, inchaço no rosto, lábios, boca, língua ou garganta, ou mesmo. Saiba identificar todos
os sintomas da anafilaxia. Quem não deve tomar A silimarina não deve ser usada por crianças ou por pessoas que tenham alergia a silimarina ou qualquer outro componente das fórmulas. Além disso, a silimarina não deve ser usada durante a gravidez e lactação. Não se deve tomar a silimarina durante a amamentação, pois há risco de transferência da silimarina para o leite materno. A silimarina também pode causar reações alérgicas graves ou anafiláticas, devendo-se procurar o pronto socorro mais próximo caso surjam sintomas como dificuldade para respirar, inchaço no rosto, lábios, boca, língua ou garganta, ou mesmo. Saiba identificar todos os sintomas da anafilaxia. Quem não deve tomar A silimarina não deve ser usada por crianças ou por pessoas que tenham alergia a silimarina ou qualquer outro componente das fórmulas. Além disso, a silimarina não deve ser usada durante a gravidez e lactação. Não se deve tomar a silimarina durante a amamentação, pois há risco de transferência da silimarina para o leite materno. A silimarina também pode causar reações alérgicas graves ou anafiláticas, devendo-se procurar o pronto socorro mais próximo caso surjam sintomas como dificuldade para respirar, inchaço no rosto, lábios, boca, língua ou garganta, ou mesmo. Saiba identificar todos os sintomas da anafilaxia. Quem não deve tomar A silimarina não deve ser usada por crianças ou por pessoas que tenham alergia a silimarina ou qualquer outro componente das fórmulas. Além disso, a silimarina não deve ser usada durante a gravidez e lactação. Não se deve tomar a silimarina durante a amamentação, pois há risco de transferência da silimarina para o leite materno. A silimarina também pode causar reações alérgicas graves ou anafiláticas, devendo-se procurar o pronto socorro mais próximo caso surjam sintomas como dificuldade para respirar, inchaço no rosto, lábios, boca, língua ou garganta, ou mesmo. Saiba identificar todos os sintomas da anafilaxia. Quem não deve tomar A silimarina não deve ser usada por crianças ou por pessoas que tenham alergia a silimarina ou qualquer outro componente das fórmulas. Além disso, a silimarina não deve ser usada durante a gravidez e lactação. Não se deve tomar a silimarina durante a amamentação, pois há risco de transferência da silimarina para o leite materno. A silimarina também pode causar reações alérgicas graves ou anafiláticas, devendo-se procurar o pronto socorro mais próximo caso surjam sintomas como dificuldade para respirar, inchaço no rosto, lábios, boca, língua ou garganta, ou mesmo. Saiba identificar todos os sintomas da anafilaxia. Quem não deve tomar A silimarina não deve ser usada por crianças ou por pessoas que tenham alergia a silimarina ou qualquer outro componente das fórmulas. Além disso, a silimarina não deve ser usada durante a gravidez e lactação. Não se deve tomar a silimarina durante a amamentação, pois há risco de transferência da silimarina para o leite materno. A silimarina também pode causar reações alérgicas graves ou anafiláticas, devendo-se procurar o pronto socorro mais próximo caso surjam sintomas como dificuldade para respirar, inchaço no rosto, lábios, boca, língua ou garganta, ou mesmo. Saiba identificar todos os sintomas da anafilaxia. Quem não deve tomar A silimarina não deve ser usada por crianças ou por pessoas que tenham alergia a silimarina ou qualquer outro componente das fórmulas. Além disso, a silimarina não deve ser usada durante a gravidez e lactação. Não se deve tomar a silimarina durante a amamentação, pois há risco de transferência da silimarina para o leite materno. A silimarina também pode causar reações alérgicas graves ou anafiláticas, devendo-se procurar o pronto socorro mais próximo caso surjam sintomas como dificuldade para respirar, inchaço no rosto, lábios, boca, língua ou garganta, ou mesmo. Saiba identificar todos os sintomas da anafilaxia. Quem não deve tomar A silimarina não deve ser usada por crianças ou por pessoas que tenham alergia a silimarina ou qualquer outro componente das fórmulas. Além disso, a silimarina não deve ser usada durante a gravidez e lactação. Não se deve tomar a silimarina durante a amamentação, pois há risco de transferência da silimarina para o leite materno. A silimarina também pode causar reações alérgicas graves ou anafiláticas, devendo-se procurar o pronto socorro mais próximo caso surjam sintomas como dificuldade para respirar, inchaço no rosto, lábios, boca, língua ou garganta, ou mesmo. Saiba identificar todos os sintomas da anafilaxia. Quem não deve tomar A silimarina não deve ser usada por crianças ou por pessoas que tenham alergia a silimarina ou qualquer outro componente das fórmulas. Além disso, a silimarina não deve ser usada durante a gravidez e lactação. Não se deve tomar a silimarina durante a amamentação, pois há risco de transferência da silimarina para o leite materno. A silimarina também pode causar reações alérgicas graves ou anafiláticas, devendo-se procurar o pronto socorro mais próximo caso surjam sintomas como dificuldade para respirar, inchaço no rosto, lábios, boca, língua ou garganta, ou mesmo. Saiba identificar todos os sintomas da anafilaxia. Quem não deve tomar A silimarina não deve ser usada por crianças ou por pessoas que tenham alergia a silimarina ou qualquer outro componente das fórmulas. Além disso, a silimarina não deve ser usada durante a gravidez e lactação. Não se deve tomar a silimarina durante a amamentação, pois há risco de transferência da silimarina para o leite materno. A silimarina também pode causar reações alérgicas graves ou anafiláticas, devendo-se procurar o pronto socorro mais próximo caso surjam sintomas como dificuldade para respirar, inchaço no rosto, lábios, boca, língua ou garganta, ou mesmo. Saiba identificar todos os sintomas da anafilaxia. Quem não deve tomar A silimarina não deve ser usada por crianças ou por pessoas que tenham alergia a silimarina ou qualquer outro componente das fórmulas. Além disso, a silimarina não deve ser usada durante a gravidez e lactação. Não se deve tomar a silimarina durante a amamentação, pois há risco de transferência da silimarina para o leite materno. A silimarina também pode causar reações alérgicas graves ou anafiláticas, devendo-se procurar o pronto socorro mais próximo caso surjam sintomas como dificuldade para respirar, inchaço no rosto, lábios, boca, língua ou garganta, ou mesmo. Saiba identificar todos os sintomas da anafilaxia. Quem não deve tomar A silimarina não deve ser usada por crianças ou por pessoas que tenham alergia a silimarina ou qualquer outro componente das fórmulas. Além disso, a silimarina não deve ser usada durante a gravidez e lactação. Não se deve tomar a silimarina durante a amamentação, pois há risco de transferência da silimarina para o leite materno. A silimarina também pode causar reações alérgicas graves ou anafiláticas, devendo-se procurar o pronto socorro mais próximo caso surjam sintomas como dificuldade para respirar, inchaço no rosto, lábios, boca, língua ou garganta, ou mesmo. Saiba identificar todos os sintomas da anafilaxia. Quem não deve tomar A silimarina não deve ser usada por crianças ou por pessoas que tenham alergia a silimarina ou qualquer outro componente das fórmulas. Além disso, a silimarina não deve ser usada durante a gravidez e lactação. Não se deve tomar a silimarina durante a amamentação, pois há risco de transferência da silimarina para o leite materno. A silimarina também pode causar reações alérgicas graves ou anafiláticas, devendo-se procurar o pronto socorro mais próximo caso surjam sintomas como dificuldade para respirar, inchaço no rosto, lábios, boca, língua ou garganta, ou mesmo. Saiba identificar todos os sintomas da anafilaxia. Quem não deve tomar A silimarina não deve ser usada por crianças ou por pessoas que tenham alergia a silimarina ou qualquer outro componente das fórmulas. Além disso, a silimarina não deve ser usada durante a gravidez e lactação. Não se deve tomar a silimarina durante a amamentação, pois há risco de transferência da silimarina para o leite materno. A silimarina também pode causar reações alérgicas graves ou anafiláticas, devendo-se procurar o pronto socorro mais próximo caso surjam sintomas como dificuldade para respirar, inchaço no rosto, lábios, boca, língua ou garganta, ou mesmo. Saiba identificar todos os sintomas da anafilaxia. Quem não deve tomar A silimarina não deve ser usada por crianças ou por pessoas que tenham alergia a silimarina ou qualquer outro componente das fórmulas. Além disso, a silimarina não deve ser usada durante a gravidez e lactação. Não se deve tomar a silimarina durante a amamentação, pois há risco de transferência da silimarina para o leite materno. A silimarina também pode causar reações alérgicas graves ou anafiláticas, devendo-se procurar o pronto socorro mais próximo caso surjam sintomas como dificuldade para respirar, inchaço no rosto, lábios, boca, língua ou garganta, ou mesmo. Saiba identificar todos os sintomas da anafilaxia. Quem não deve tomar A silimarina não deve ser usada por crianças ou por pessoas que tenham alergia a silimarina ou qualquer outro componente das fórmulas. Além disso, a silimarina não deve ser usada durante a gravidez e lactação. Não se deve tomar a silimarina durante a amamentação, pois há risco de transferência da silimarina para o leite materno. A silimarina também pode causar reações alérgicas graves ou anafiláticas, devendo-se procurar o pronto socorro mais próximo caso surjam sintomas como dificuldade para respirar, inchaço no rosto, lábios, boca, língua ou garganta, ou mesmo. Saiba identificar todos os sintomas da anafilaxia. Quem não deve tomar A silimarina não deve ser usada por crianças ou por pessoas que tenham alergia a silimarina ou qualquer outro componente das fórmulas. Além disso, a silimarina não deve ser usada durante a gravidez e lactação. Não se deve tomar a silimarina durante a amamentação, pois há risco de transferência da silimarina para o leite materno. A
silimarina também pode causar reações alérgicas graves ou anafiláticas, devendo-se procurar o pronto socorro mais próximo caso surjam sintomas como dificuldade para respirar, inchaço no rosto, lábios, boca, língua ou garganta, ou mesmo. Saiba identificar todos os sintomas da anafilaxia. Quem não deve tomar A silimarina não deve ser usada por crianças ou por pessoas que tenham alergia a silimarina ou qualquer outro componente das fórmulas. Além disso, a silimarina não deve ser usada durante a gravidez e lactação. Não se deve tomar a silimarina durante a amamentação, pois há risco de transferência da silimarina para o leite materno. A silimarina também pode causar reações alérgicas graves ou anafiláticas, devendo-se procurar o pronto socorro mais próximo caso surjam sintomas como dificuldade para respirar, inchaço no rosto, lábios, boca, língua ou garganta, ou mesmo. Saiba identificar todos os sintomas da anafilaxia. Quem não deve tomar A silimarina não deve ser usada por crianças ou por pessoas que tenham alergia a silimarina ou qualquer outro componente das fórmulas. Além disso, a silimarina não deve ser usada durante a gravidez e lactação. Não se deve tomar a silimarina durante a amamentação, pois há risco de transferência da silimarina para o leite materno. A silimarina também pode causar reações alérgicas graves ou anafiláticas, devendo-se procurar o pronto socorro mais próximo caso surjam sintomas como dificuldade para respirar, inchaço no rosto, lábios, boca, língua ou garganta, ou mesmo. Saiba identificar todos os sintomas da anafilaxia. Quem não deve tomar A silimarina não deve ser usada por crianças ou por pessoas que tenham alergia a silimarina ou qualquer outro componente das fórmulas. Além disso, a silimarina não deve ser usada durante a gravidez e lactação. Não se deve tomar a silimarina durante a amamentação, pois há risco de transferência da silimarina para o leite materno. A silimarina também pode causar reações alérgicas graves ou anafiláticas, devendo-se procurar o pronto socorro mais próximo caso surjam sintomas como dificuldade para respirar, inchaço no rosto, lábios, boca, língua ou garganta, ou mesmo. Saiba identificar todos os sintomas da anafilaxia. Quem não deve tomar A silimarina não deve ser usada por crianças ou por pessoas que tenham alergia a silimarina ou qualquer outro componente das fórmulas. Além disso, a silimarina não deve ser usada durante a gravidez e lactação. Não se deve tomar a silimarina durante a amamentação, pois há risco de transferência da silimarina para o leite materno. A silimarina também pode causar reações alérgicas graves ou anafiláticas, devendo-se procurar o pronto socorro mais próximo caso surjam sintomas como dificuldade para respirar, inchaço no rosto, lábios, boca, língua ou garganta, ou mesmo. Saiba identificar todos os sintomas da anafilaxia. Quem não deve tomar A silimarina não deve ser usada por crianças ou por pessoas que tenham alergia a silimarina ou qualquer outro componente das fórmulas. Além disso, a silimarina não deve ser usada durante a gravidez e lactação. Não se deve tomar a silimarina durante a amamentação, pois há risco de transferência da silimarina para o leite materno. A silimarina também pode causar reações alérgicas graves ou anafiláticas, devendo-se procurar o pronto socorro mais próximo caso surjam sintomas como dificuldade para respirar, inchaço no rosto, lábios, boca, língua ou garganta, ou mesmo. Saiba identificar todos os sintomas da anafilaxia. Quem não deve tomar A silimarina não deve ser usada por crianças ou por pessoas que tenham alergia a silimarina ou qualquer outro componente das fórmulas. Além disso, a silimarina não deve ser usada durante a gravidez e lactação. Não se deve tomar a silimarina durante a amamentação, pois há risco de transferência da silimarina para o leite materno. A silimarina também pode causar reações alérgicas graves ou anafiláticas, devendo-se procurar o pronto socorro mais próximo caso surjam sintomas como dificuldade para respirar, inchaço no rosto, lábios, boca, língua ou garganta, ou mesmo. Saiba identificar todos os sintomas da anafilaxia. Quem não deve tomar A silimarina não deve ser usada por crianças ou por pessoas que tenham alergia a silimarina ou qualquer outro componente das fórmulas. Além disso, a silimarina não deve ser usada durante a gravidez e lactação. Não se deve tomar a silimarina durante a amamentação, pois há risco de transferência da silimarina para o leite materno. A silimarina também pode causar reações alérgicas graves ou anafiláticas, devendo-se procurar o pronto socorro mais próximo caso surjam sintomas como dificuldade para respirar, inchaço no rosto, lábios, boca, língua ou garganta, ou mesmo. Saiba identificar todos os sintomas da anafilaxia. Quem não deve tomar A silimarina não deve ser usada por crianças ou por pessoas que tenham alergia a silimarina ou qualquer outro componente das fórmulas. Além disso, a silimarina não deve ser usada durante a gravidez e lactação. Não se deve tomar a silimarina durante a amamentação, pois há risco de transferência da silimarina para o leite materno. A silimarina também pode causar reações alérgicas graves ou anafiláticas, devendo-se procurar o pronto socorro mais próximo caso surjam sintomas como dificuldade para respirar, inchaço no rosto, lábios, boca, língua ou garganta, ou mesmo. Saiba identificar todos os sintomas da anafilaxia. Quem não deve tomar A silimarina não deve ser usada por crianças ou por pessoas que tenham alergia a silimarina ou qualquer outro componente das fórmulas. Além disso, a silimarina não deve ser usada durante a gravidez e lactação. Não se deve tomar a silimarina durante a amamentação, pois há risco de transferência da silimarina para o leite materno. A silimarina também pode causar reações alérgicas graves ou anafiláticas, devendo-se procurar o pronto socorro mais próximo caso surjam sintomas como dificuldade para respirar, inchaço no rosto, lábios, boca, língua ou garganta, ou mesmo. Saiba identificar todos os sintomas da anafilaxia. Quem não deve tomar A silimarina não deve ser usada por crianças ou por pessoas que tenham alergia a silimarina ou qualquer outro componente das fórmulas. Além disso, a silimarina não deve ser usada durante a gravidez e lactação. Não se deve tomar a silimarina durante a amamentação, pois há risco de transferência da silimarina para o leite materno. A silimarina também pode causar reações alérgicas graves ou anafiláticas, devendo-se procurar o pronto socorro mais próximo caso surjam sintomas como dificuldade para respirar, inchaço no rosto, lábios, boca, língua ou garganta, ou mesmo. Saiba identificar todos os sintomas da anafilaxia. Quem não deve tomar A silimarina não deve ser usada por crianças ou por pessoas que tenham alergia a silimarina ou qualquer outro componente das fórmulas. Além disso, a silimarina não deve ser usada durante a gravidez e lactação. Não se deve tomar a silimarina durante a amamentação, pois há risco de transferência da silimarina para o leite materno. A silimarina também pode causar reações alérgicas graves ou anafiláticas, devendo-se procurar o pronto socorro mais próximo caso surjam sintomas como dificuldade para respirar, inchaço no rosto, lábios, boca, língua ou garganta, ou mesmo. Saiba identificar todos os sintomas da anafilaxia. Quem não deve tomar A silimarina não deve ser usada por crianças ou por pessoas que tenham alergia a silimarina ou qualquer outro componente das fórmulas. Além disso, a silimarina não deve ser usada durante a gravidez e lactação. Não se deve tomar a silimarina durante a amamentação, pois há risco de transferência da silimarina para o leite materno. A silimarina também pode causar reações alérgicas graves ou anafiláticas, devendo-se procurar o pronto socorro mais próximo caso surjam sintomas como dificuldade para respirar, inchaço no rosto, lábios, boca, língua ou garganta, ou mesmo. Saiba identificar todos os sintomas da anafilaxia. Quem não deve tomar A silimarina não deve ser usada por crianças ou por pessoas que tenham alergia a silimarina ou qualquer outro componente das fórmulas. Além disso, a silimarina não deve ser usada durante a gravidez e lactação. Não se deve tomar a silimarina durante a amamentação, pois há risco de transferência da silimarina para o leite materno. A silimarina também pode causar reações alérgicas graves ou anafiláticas, devendo-se procurar o pronto socorro mais próximo caso surjam sintomas como dificuldade para respirar, inchaço no rosto, lábios, boca, língua ou garganta, ou mesmo. Saiba identificar todos os sintomas da anafilaxia. Quem não deve tomar A silimarina não deve ser usada por crianças ou por pessoas que tenham alergia a silimarina ou qualquer outro componente das fórmulas. Além disso, a silimarina não deve ser usada durante a gravidez e lactação. Não se deve tomar a silimarina durante a amamentação, pois há risco de transferência da silimarina para o leite materno. A silimarina também pode causar reações alérgicas graves ou anafiláticas, devendo-se procurar o pronto socorro mais próximo caso surjam sintomas como dificuldade para respirar, inchaço no rosto, lábios, boca, língua ou garganta, ou mesmo. Saiba identificar todos os sintomas da anafilaxia. Quem não deve tomar A silimarina não deve ser usada por crianças ou por pessoas que tenham alergia a silimarina ou qualquer outro componente das fórmulas. Além disso, a silimarina não deve ser usada durante a gravidez e lactação. Não se deve tomar a silimarina durante a amamentação, pois há risco de transferência da silimarina para o leite materno. A silimarina também pode causar reações alérgicas graves ou anafiláticas, devendo-se procurar o pronto socorro mais próximo caso surjam sintomas como dificuldade para respirar, inchaço no rosto, lábios, boca, língua ou garganta, ou mesmo. Saiba identificar todos os sintomas da anafilaxia. Quem não deve tomar A silimarina não deve ser usada por crianças ou por pessoas que tenham
alergia a silimarina ou qualquer outro componente das fórmulas