

Click to verify























FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Cada 100 g contienen: 1.0% 2.5% Hidrocortisona 1.00 g 2.500 g Excipiente cbp 100.00 g 100.00 g INDICACIONES TERAPÉUTICAS: COLLICORT es un corticosteroide tópico para uso dérmico. COLLICORT está indicado en el tratamiento de una amplia variedad de padecimientos inflamatorios, alérgicos y pruriginosos de la piel y mucosas como: dermatitis atópica, dermatitis por contacto, eccema de pies y manos, eccema numular, neurodermatitis, liquen plano y dermatitis por estasis. FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA: La Hidrocortisona es un esteroide con acción antiinflamatoria, antialérgica y antipruriginosa; tiene como características su actividad glucocorticoide y mínimo riesgo de reacciones adversas. Los glucocorticoides pueden ser absorbidos por la piel; si la administración es crónica o en grandes áreas puede ocasionar efectos sistémicos. Una vez en el plasma, el 90% o más de la Hidrocortisona se une en forma reversible a proteínas. El 70% se metaboliza en el hígado. La mayor parte se excreta por orina. CONTRAINDICACIONES: Los esteroides tópicos están contraindicados en presencia de padecimientos virales de la piel, como varicela y el herpes. Pueden aumentar la susceptibilidad a las infecciones como la tuberculosis. Deben usarse con precaución cuando existen alteraciones como la diabetes, trastornos del balance hídrico y de electrolitos; tendencia a la úlcera péptica, osteoporosis y trastornos de la conducta. La absorción sistémica puede inducir inhibición del crecimiento y alteración del eje hipotálamo-suprarrenal. No deben ser usados cuando exista hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: Se ha reportado que los esteroides tópicos no poseen efectos adversos sobre el feto; sin embargo, la seguridad de su utilización no ha sido absolutamente establecida. El uso debe ser valorado por el médico, no debiendo ser prescrito en grandes cantidades o por periodos prolongados, especialmente durante el primer trimestre del embarazo. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Se han reportado las siguientes reacciones secundarias: sensación de quemadura, prurito, irritación, resequedad, folliculitis infecciosa, atrofia dérmica, estrías, hipertriosis, erupción acneiforme e hipopigmentación. A grandes dosis o con tratamientos crónicos puede haber absorción sistémica. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: Aunque se ha reportado que los esteroides tópicos no poseen efectos adversos sobre el feto, la seguridad de uso no ha sido absolutamente establecida. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: En presencia de infecciones deberá instituirse la administración de un antibacteriano, un antiviral o antimicótico, según sea el caso, y deberá establecerse una estricta vigilancia. Si no se obtiene una respuesta favorable deberá suspenderse el tratamiento hasta lograr un adecuado control de la infección. ALTERACIONES EN LOS RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO: En el caso de absorción sistémica importante puede elevarse la glucosa plasmática y producirse una resistencia a la insulina. También puede incrementarse la lipólisis de triglicéridos y causar incremento de la concentración plasmática de sodio, crear hipocalemia y alcalosis. PRECAUCIONES GENERALES: Este medicamento está indicado sólo para uso cutáneo, si se aplica en exceso, no se obtendrán resultados más rápidos ni mejores. Sólo se intensificarán los efectos no deseados. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Vía de administración: Tópica. Dosis: Aplicar sobre el área afectada 3 ó 4 veces al día. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: Para cualquier producto corticosteroide tópico, su uso prolongado puede producir atrofia de la piel y del tejido celular subcutáneo, cuando es usado en áreas intertriginosas o flexoras, o en la cara, esto puede ocurrir aun cuando sean usados por periodos cortos. La absorción sistémica significativa puede resultar cuando los corticoesteroides se aplican en áreas extensas del cuerpo. La administración de corticosteroides tópicos a los niños deberá limitarse al periodo de tratamiento más corto y a la menor cantidad compatible con un régimen terapéutico efectivo. Si no ocurre una respuesta favorable rápidamente el uso de COLLICORT deberá ser discontinuado hasta que la infección haya sido adecuadamente controlada. El uso de pañales ajustados o de calzones de hule en un niño puede hacer las veces de una técnica oclusiva e incrementar la absorción de los corticosteroides tópicos en la piel subyacente. Los pacientes (particularmente niños) recibiendo una cantidad grande de corticosteroides tópicos aplicada a una superficie extensa o bajo una técnica oclusiva deberán ser evaluados en busca de supresión hipotálamo-hipofisaria-adrenal (cortisol urinario libre, prueba de estimulación de A.C.T.H.). Si se encuentra supresión, la dosis deberá reducirse o discontinuarse el tratamiento. Esta preparación no es para uso oftálmico. PRESENTACIONES: Caja de cartón con tubo de aluminio con 60 g al 1.0%. Caja de cartón con tubo de aluminio con 60 g al 2.5%. RECOMENDACIONES SOBRE ALMACENAMIENTO: Conserve el tubo bien cerrado, a no más de 30°C. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Literatura exclusiva para médicos. Su venta requiere receta médica. En caso de embarazo o lactancia consulte a su médico. No se deje al alcance de los niños. Conserve el tubo bien cerrado, a no más de 30 °C. Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COLLINS, S.A. de C.V. Ciprés 1677, Col. del Fresno, C.P. 44900 Guadalajara, Jalisco, México Reg. Núm. 111M2001, SSA IV La hidrocortisona en crema es un medicamento ampliamente utilizado en el ámbito de la dermatología y la medicina general. Conocida por sus propiedades antiinflamatorias, la hidrocortisona en crema es útil para tratar diversas condiciones de la piel, como eczemas, dermatitis, picaduras de insectos, entre otras. Su aplicación tópica permite reducir la inflamación, aliviar el enrojecimiento y controlar la picazón. Es importante destacar que su uso debe ser indicado y supervisado por un profesional de la salud, ya que un mal uso o abuso de esta crema puede generar efectos secundarios no deseados. ¡Descubre más sobre para qué sirve la hidrocortisona en crema en nuestro artículo! #hidrocortisona #crema #dermatología El uso de la hidrocortisona en crema: una herramienta fundamental para los profesionales de la salud. El uso de la hidrocortisona en crema se ha convertido en una herramienta fundamental para los profesionales de la salud. Esta sustancia, derivada de la hormona corticosteroide natural producida por las glándulas suprarrenales, se utiliza principalmente en el tratamiento de enfermedades inflamatorias de la piel. La hidrocortisona en crema posee propiedades antiinflamatorias, antipruriginosas y vasoconstrictoras, lo que la hace muy efectiva en el alivio de síntomas como enrojecimiento, picazón y edema. Esto la convierte en una opción terapéutica eficaz para afecciones cutáneas como dermatitis, eczema, psoriasis, entre otras. Es importante destacar que el uso adecuado de la hidrocortisona en crema requiere de la prescripción y supervisión de un profesional de la salud. Este debe evaluar cuidadosamente cada caso en particular, teniendo en cuenta la gravedad de la afección y la respuesta individual del paciente. Además, es esencial seguir las indicaciones del profesional en cuanto a la dosis y la duración del tratamiento. El uso prolongado e indiscriminado de la hidrocortisona en crema puede tener efectos adversos, como el adelgazamiento de la piel, aparición de estrías y cambios en la pigmentación. En resumen, la hidrocortisona en crema se ha convertido en una herramienta valiosa para los profesionales de la salud en el tratamiento de diversas afecciones cutáneas. Sin embargo, su uso debe ser adecuado y supervisado para evitar efectos secundarios indeseables. Algunas dudas para resolver.. ¿Qué indicaciones tiene la hidrocortisona en crema en el ámbito de la medicina? La hidrocortisona en crema se utiliza principalmente en el ámbito de la medicina como tratamiento tópico para aliviar los síntomas de inflamación, picazón y enrojecimiento de la piel. Su indicación más común es en afecciones dermatológicas como dermatitis, eczemas y psoriasis. Sin embargo, su uso debe ser supervisado por un profesional de la salud ya que puede tener efectos secundarios si se utiliza de forma incorrecta o por un tiempo prolongado. ¿Cuál es la dosis recomendada de hidrocortisona en crema para tratar diferentes enfermedades de la piel? La dosis recomendada de hidrocortisona en crema para tratar diferentes enfermedades de la piel puede variar según la condición y la gravedad de la misma. Es importante consultar a un profesional de la salud que evalúe cada caso de forma individual y determine la dosis adecuada. Se debe seguir estrictamente las indicaciones del médico y no exceder la duración ni la cantidad recomendada. ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios o contraindicaciones de utilizar hidrocortisona en crema como tratamiento dermatológico? La hidrocortisona en crema puede tener varios efectos secundarios y contraindicaciones. Algunos posibles efectos secundarios incluyen adelgazamiento de la piel, enrojecimiento, irritación, picor o ardor. Además, su uso prolongado puede llevar a atrofia cutánea. También se debe evitar aplicarla en áreas de la piel que presenten infecciones, heridas abiertas o quemaduras. Es importante seguir las indicaciones del médico y no exceder la dosis recomendada. Nombre local: COLLICORT CREMA 1 % País: México Laboratorio: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COLLINS, S.A. DE C.V. Registro sanitario: 111M2001 SSA Vía: cutáneo Forma: crema ATC: Hidrocortisona tópica (D07AA02) Embarazo: Evaluar riesgo/beneficio lactancia: evitar Dermatológicos > Preparados dermatológicos con corticosteroides > Corticosteroides, monofármacos > Corticosteroides de baja potencia (grupo I) Propiedades antiinflamatorias, antipruriginosas y vasoconstrictoras. Difunde a través de las membranas celulares y forma complejos con receptores citoplasmáticos específicos. Entran en el núcleo celular, se unen al ADN y estimulan la transcripción del ARN mensajero (ARNm) y la posterior síntesis de varios enzimas, que se piensa son los responsables de los efectos antiinflamatorios de los corticosteroides aplicados tópicamente. Inhiben también la migración de neutrófilos y macrófagos al foco inflamatorio. Actúa como inhibidor del metabolismo del ác. araquidónico, que es sustrato común para las 2 vías metabólicas oxidativas (ciclooxigenasa y lipoxigenasa) que producen autacoides con un papel destacado en la inflamación: prostaglandinas, prostaciclina y tromboxano por una vía; hidroxiácidos y leucotrienos, por otra. Indicaciones terapéuticasHidrocortisona tópica Tto. local de manifestaciones inflamatorias y pruriginosas de las dermatosis que responden a los corticosteroides, tales como: dermatitis de contacto alérgica e irritativa, dermatitis atópica, neurodermatitis, dermatitis seborreica, psoriasis. Picaduras de insectos, alergias por contacto con jabones, detergentes, metales y ortigas.Tto. local, temporal y sintomático del picor externo anal asociado con hemorroides. PosologíaHidrocortisona tópica Tópica. - Concentraciones al 0,5% (crema, espuma) Ads. y niños >12 años: aplicar una fina capa 1-2 veces/día. En casos graves 3-4 veces/día. Niños 65 años siempre bajo supervisión médica. Uso externo en hemorroides (crema): Ads. y niños > 12 años: aplicar por la mañana, por la noche y después de cada evacuación hasta un máx.de 4 veces/ día. No aplicar más de 7 días seguidos salvo criterio médico. - Concentraciones al 1% y 2,5% (pomada, emulsión). Ads.: aplicar una capa fina sobre la zona afectada 2-3 veces/día, hasta mejoría, luego reducir la frecuencia de aplicación. No exceder de 2 sem. Si se utiliza en la cara, 1 sem como máx. Niños (concentración al 1%): Aplicar en el área afectada una fina capa 2-3 veces/día, hasta que se produzca la mejoría, luego reducir la frecuencia de aplicación. Las emulsiones son especialmente apropiadas para el tto. de las zonas pilosas sometidas a roce como, por ejemplo, las axilas. ContraindicacionesHidrocortisona tópica Hipersensibilidad a hidrocortisona; presencia de procesos cutáneos tuberculosos o sifilíticos, infecciones víricas (tales como herpes o varicela); rosácea, dermatitis perioral, reacciones vacunales cutáneas en el área a tratar; acné vulgaris; prurito que no presente inflamación; infecciones cutáneas; úlceras de encamados; escoceduras o irritaciones de los pañales; mucosas (anal, genital, bucal); hemorragia hemorroidal. Advertencias y precaucionesHidrocortisona tópica I.H.: diabetes mellitus, tuberculosis, infecciones o llagas, enf. cutánea que da lugar a adelgazamiento de piel y aparición de hematomas; pacientes pediátricos y ancianos, más susceptibles a la toxicidad de hidrocortisona. Los corticoides que se administran por vía tópica presentan cierta absorción sistémica. Si se aplican en áreas extensas y además se usa un vendaje oclusivo o durante un período prolongado aumentan la absorción, y con ello los efectos sistémicos, incluyendo supresión reversible del eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal, que incluye manifestaciones del síndrome de Cushing. Si se observa cualquiera de las alteraciones anteriores interrumpir el tto. de forma gradual reduciendo la frecuencia de aplicación. La interrupción brusca, puede provocar insuficiencia de glucocorticoides Evitar contacto con ojos y mucosas. Insuficiencia hepáticaHidrocortisona tópica Precaución. InteraccionesHidrocortisona tópica Aunque no se han descrito interacciones con otras sustancias no aplicar simultáneamente en la misma zona que otras preparaciones tópicas. Lob: pruebas de diagnostico: función suprarrenal por estimulación ACTH o determinación de cortisol en plasma y del eje hipotalámico-hipofisarió-suprartrenal, disminuidas. Las concentraciones de glucosa en sangre y orina, elevadas. EmbarazoHidrocortisona tópica No existen estudios adecuados y bien controlados en mujeres embarazadas sobre la capacidad teratogénica de los corticosteroides tópicos. Estudios realizados en animales muestran que cuando se administran en grandes dosis o durante periodos prolongados, se absorben sistémicamente y pueden producir malformaciones congénitas. Por lo tanto sólo deben utilizarse en el embarazo cuando el beneficio potencial justifique los posibles riesgos para el feto. LactanciaHidrocortisona tópica Se desconoce si la administración tópica de corticosteroides puede resultar en absorción sistémica suficiente para producir cantidades detectables en la leche materna. Se debe decidir si es necesario interrumpir la lactancia o interrumpir el tratamiento, teniendo en cuenta el beneficio de la lactancia para el niño y el beneficio del medicamento para la madre. Reacciones adversasHidrocortisona tópica Dermatitis de contacto/dermatitis; escozor, retraso en la cicatrización, ardor, hematomas, telangiectasia, erupciones acneiformes, aumento de la sudoración, rosácea, dermatitis perioral, edema, hiperglucemia/glucosuria, osteoporosis. © Vidal Vademecum Fuente: El contenido de esta monografía de principio activo según la clasificación ATC, ha sido redactado teniendo en cuenta la información clínica de todos los medicamentos autorizados y comercializados en España clasificados en dicho código ATC. Para conocer con detalle la información autorizada por la AEMPS para cada medicamento, deberá consultar la correspondiente Ficha Técnica autorizada por la AEMPS. Monografías Principio Activo: 18/05/2016 Ver listado de abreviaturas